

ACONDICIONAMIENTO DE AGUA CON PROXY-CLEAN[®] PARA INSTALACIONES CON PAVOS

EL SIGUIENTE ES EL PROGRAMA RECOMENDADO PARA INSTALACIONES CON PAVOS:

- Limpie las líneas de agua cuando el criadero esté vacío con una solución al 3% de Proxy-Clean[®].
- Si los minerales son un problema, las líneas de agua también se deben desincrustar de la acumulación de minerales por medio de colocar una solución al 3% de Mineral-Clean[®] en las líneas de agua durante 24 horas, y luego enjuagarlas mediante hacer correr agua por ellas.
- Durante la totalidad de la parvada, el agua deberá ser tratada con una solución de 25 a 100 ppm de Proxy-Clean[®]. Si eso no es posible, entonces el agua deberá ser tratada durante por lo menos 48 horas cada semana con una solución de 50 a 100 ppm de Proxy-Clean[®].

USO ENTRE PARVADAS PARA ELIMINAR SEDIMENTOS PESADOS DEL SISTEMA DE AGUA PARA BEBER:

1. Utilice una bomba dosificadora Qwik-Blend™ para administrar una solución al 3% directamente desde el envase de Proxy-Clean[®] al sistema de agua.
2. Para proporcionar una liberación de aire adecuada e impulsar el Proxy-Clean[®] hacia la línea, retire una tapa (o abra una válvula) en el extremo del sistema de bebederos.
3. Coloque un cubo recolector al final de la línea (si no hay mangueras de desagüe hacia el exterior) donde se ha removido la tapa.
4. Esté atento a las burbujas en el cubo o en el suelo afuera donde descargan las mangueras.
5. Vuelva a colocar las tapas (o cierre la válvula) al final de la línea de agua.
6. Active todos los bebederos. Permita que la solución repose entre 24 y 72 horas.
7. Enjuague todas las líneas por medio de hacer correr agua fresca por ellas.
8. Termine por medio de activar todos los bebederos nuevamente.

PARA LOS SISTEMAS DE BEBEDEROS PLASSON:

- Cierre el agua, drene las mangueras y vacíe los bebederos.
- Siga las instrucciones a la izquierda para administrar una solución al 3% de Proxy-Clean[®] a través de la línea de agua y a los bebederos.
- Deje que los bebederos se llenen y se remojen entre 24 y 72 horas.
- Haga correr agua por las líneas aéreas hasta que haya agua fresca.
- Vacíe los bebederos.

TRATAMIENTO DE AGUA CONTINUO CON LA PARVADA:

Logre un tratamiento continuo de toda la granja mientras las aves están en el granero con el sistema de Bomba de Diafragma Agrow-Clean™ de Productos Proxy-Clean[®]. ¡Trate hasta 225 000 galones de agua POR DÍA!

Hable con su representante de servicios técnicos de Proxy-Clean[®]
o su representante de ventas de Clear View.

PARA EL TRATAMIENTO INDIVIDUAL DEL GRANERO MIENTRAS LAS AVES ESTÁN EN EL GRANERO

POR MEDIO DE USAR PROXY-CLEAN® CON UNA BOMBA DOSIFICADORA 1:128:

1. Mezcle 8 onzas (237 ml) de Proxy-Clean® en 5 galones (19 litros) de agua (esto es aproximadamente 0,50 ppm de peróxido de hidrógeno).
2. Inyecte esto en la línea de agua usando una bomba dosificadora 1:128.
3. Mantenga siempre tapado el cubo/recipiente de la bomba dosificadora.
4. La solución madre debe volver a prepararse fresca cada 5 días.

CÓMO USAR PROXY-CLEAN® CON UNA BOMBA STENNER:

(CONTÁCTENOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE OTRAS MARCAS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS)

1. Encienda la bomba Stenner en 5 segundos al 30%.
2. Coloque el tubo de toma directamente en un recipiente de Proxy-Clean®.
3. Use las tiras reactivas de peróxido de hidrógeno para probar las ppm de peróxido de hidrógeno al inicio del sistema de agua. Ajuste la Stenner de modo que se alcancen 50 ppm al inicio de la línea. Es importante que esta lectura se realice al inicio de la línea de agua y no al final cuando comience. Las ppm de peróxido de hidrógeno a la larga aparecerán al final de la línea de agua. Dependiendo de la carga de suciedad, esto puede llevar varios días.

- * Puede usarse en cualquier momento en que no se agreguen vacunas, antibióticos o probióticos a través de la línea de agua.
- Recomendado para 24 horas después de que se hayan agregado los productos suplementarios a través de la línea de agua.
- También se recomienda para 7 días después de la adición de cualquier producto de vacunación.